

CHECK LIST PARODONTALE BOPT Conférence CNO 2 octobre 2025



DATE :
PATIENT :
DENT :

ANAMNÈSE
Bonne Santé
Tabagisme
Diabète
Autre Maladie Systémique

EXAMEN CLINIQUE GÉNÉRAL



BIOTYPE
Fin
Épais




INFLAMMATION
Absente
Modérée
Sévère



SOURIRE GINGIVAL
Liebart 1-2
Liebart 3-4

STATUT PARODONTAL DU PATIENT

CHARTING PARO



perio-tools.com

Indice de plaque
 $\circ \leq 20\% < \square$

Indice de saignement
 $\circ \leq 10\% < \square$

Profondeurs de poche
 $\circ \leq 4 \text{ mm} < \Delta$



Santé Gingivite Parodontite

CONDITIONS PARODONTALES LOCALES


EXAMEN CLINIQUE LOCAL




Sondage local
 $< 1 \text{ mm} \Delta$
 $1-3 \text{ mm} \circ$
 $\geq 4 \text{ mm} \square$

Sondage prothétique
(distance partie dentaire exploitable la plus apicale – attache conjonctive)
 $< 1 \text{ mm} \Delta$
 $1-2 \text{ mm} \square$
 $> 2 \text{ mm} \circ$

ÉTAT DES PAPILLES : classification de Jemt (1997)



TISSU KÉRATINISÉ
 $> 3 \text{ mm} \circ$
 $1-3 \text{ mm} \square$
 $< 1 \text{ mm} \Delta$



RÉCESSION PARODONTALE
Non
Oui




➤ Greffe de gencive ?

Élongation ?

EXAMEN COMPLÉMENTAIRE (RADIO)

2D : espace biologique
(attache conjonctive + attache épithéliale)
 $\Delta < 2 \text{ mm} \leq \circ$



Examen systématique

2de intention

3D : éruption passive altérée
distance os – jonction amélocémentaire réduite
 $\Delta < 2 \text{ mm} \leq \circ$



Examen facultatif

➤ Élongation coronaire si espace bio < 2 et si éruption passive altérée

CONTRE-INDICATIONS :
diabète, tabac, parodontite, TK < 1 , perte des papilles, sondage local et prothétique < 1

PAS DE BOPT EN L'ÉTAT

CONDITIONS DÉFAVORABLES :
biotype fin, gingivite, récession, TK 1-3 mm, papilles hypertrophiques, sondage prothétique 1-2 mm

RÉÉVALUER APRÈS TRAITEMENT

CONDITIONS FAVORABLES :
biotype épais, TK > 3 mm, santé parodontale, papilles saines, sondage prothétique > 2

BOPT OK